


كيف تعتني بطفلك المصاب بجرح ناتج عن العض

ستقدم لك هذه النشرة معلومات عن الجروح الناتجة عن العض وعلاجها ونصائح الرعاية المنزلية.



ما هو الجرح الناتج عن العض؟

الجرح الناتج عن العض هو الجرح الذي يصاب به طفلك عندما يعضه إنسان أو حيوان، وهو أمر شائع بين الأطفال.

- تسبب القطط والكلاب معظم عضات الحيوانات.
- يمكن أن تحدث عضات الإنسان بشكل شائع عندما يعض الأطفال بعضهم بعضًا أثناء اللعب. وتعتبر حالات العدوى الخطيرة مثل داء الكلب والتيتانوس من الحالات النادرة للغاية في قطر.

ما هي الأنواع المختلفة للعضات؟

- يمكن تصنيف العضات استنادًا إلى الحيوان المسبب للعضة مثل عضات الكلاب أو القطط أو القوارض أو عضات الإنسان.
- لدى الإنسان والحيوان بكتيريا ضارة داخل أفواههم، الأمر الذي يمكن أن يسبب الإصابة بعدوى خصوصًا عند اختراق الجلد. ونادرًا ما تكون حالات العدوى هذه خطيرة إذا تم علاجها على الفور، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تدخل البكتيريا إلى الجسم وتسبب حالات عدوى شديدة.
- من المرجح أن تنقل الحيوانات ذات الفراء داء الكلب، أما الحيوانات التي ليس لها فراء (بجانِب البشر) لا يمكنها حمل داء الكلب.

كيف يتم علاج العضة؟

يعتمد الأمر على حجم الجرح الناتج عن العضة. سيطرح عليك الطبيب بضعة أسئلة حول صحة طفلك وسيفحصه.

ويمكن أن تشمل خيارات العلاج:

- غسل وتنظيف الجرح الناتج عن العض وإزالة أي أنسجة تالفة.
- إعطاء المضادات الحيوية.
- إعطاء جرعة منشطة من لقاح التيتانوس و/أو داء الكلب.
- في بعض الأحيان، قد تكون هناك حاجة إلى إجراء فحص بالأشعة السينية إذا كانت العضات شديدة بما يكفي لتسبب كسراً في العظام أو كان هناك اشتباه في وجود أجسام غريبة -مثل الأسنان- داخل الجرح.
- تتطلب بعض العضات المتابعة المنتظمة عن كثب في عيادة متخصصة. سيتم ترتيب ذلك وسيتم إبلاغك إذا كانت حالة طفلك تتطلب المتابعة.
- إذا عض طفلك شخص معروفة إصابته بمرض معين مثل فيروس نقص المناعة البشرية أو التهاب الكبد، فهناك خطر ضئيل لانتقال العدوى إذا كانت العضة ملوثة بالدم، لذا فقد يتم تقديم علاج محدد لطفلك لتقليل فرصة انتقال العدوى.

نصائح للرعاية المنزلية

اسع للحصول على المشورة الطبية فوراً إذا تعرض طفلك لعضة حيوان أو إنسان. يمكن أن تسبب العضات في اليدين أو الوجه أو المفاصل مشاكل خطيرة مثل حالات العدوى الخطيرة إذا تركت دون علاج.

- اشطف الجرح على الفور تحت ماء الصنبور الدافئ الجاري لمدة 10 دقائق على الأقل.
- قم بإزالة أي أجسام غريبة من الجرح مثل الشعر أو الأسنان أو الأوساخ.
- حفز نزيف الجرح من خلال الضغط عليه برفق.
- إذا كان الجرح ينزف بغزارة، ضع ضمادة نظيفة عليه واضغط برفق ثم جفف الجرح وضع عليه ضمادة لاصقة.
- يمكن إعطاء أدوية تسكين الألم البسيطة مثل:

- باراسيتامول (أي علامة تجارية) أو إيبوبروفين (أي علامة تجارية).
- اتبع النصائح الواردة على عبوة الدواء بشأن الجرعة الصحيحة لطفلك.
- لا تعطي طفلك أسبرين لأنه يمكن أن يسبب مشكلات خطيرة.
- تأكد من حضور جميع مواعيد المتابعة حسب وفقاً لما هو موصى به.

متى ينبغي لي طلب المشورة الطبية؟

اسع للحصول على المشورة الطبية إذا:

- عض طفلك أو خدشه حيوان برّي مثل الثعبان أو الثعلب
- تعرض طفلك للعض وهو يعاني من داء السكري أو مرض كبدي أو مرض مزمن آخر
- كان طفلك ينزف من الجرح الناتج عن العض
- لم يتلق طفلك اللقاحات بالكامل

اذهب إلى قسم الطوارئ إذا كان طفلك:

- تعرض لعضة أدت إلى قطع جزء من الجسم مثل الإصبع، نظفه بماء دافئ من الصنبور وقم بتغطيته بمنديل نظيف واحتفظ به في كيس بلاستيكي محاط بالثلج ثم اصطحب الطفل إلى قسم طوارئ محلي
- يعاني من نزيف مستمر من الجرح الناتج عن العض
- قد تعرض للعض حول المفصل ولا يمكنه ثنيه بسهولة
- يعاني من احمرار وتورم حول موضع الجرح
- يعاني من ألم شديد
- لديه صديد حول الجرح
- يعاني من حمى تصل إلى 37,8 درجة مئوية أو أكثر
- يشعر أنه ليس على ما يرام
- يعاني من ظهور خطوط حمراء على الجلد بسبب الجرح